


COLON E RETTO

Anni 2005-2017. Sintesi dei dati di incidenza. COLON E RETTO

	MASCHI	FEMMINE
Numero casi	3111	2320
% sul totale	11	10,4
Tasso grezzo	84,1	60,3
Tasso standardizzato	87,2	52,8
Rischio cumulativo	4,5	2,8
Età media	70,4	71,1
Età mediana	72	73
Oss/Att AIRTUM (2008-2013)	0,92	0,87
Oss/Att Centro (2008-2013)	0,85	0,82
Oss/Att Nord (2008-2013)	0,87	0,83
Oss/Att Sud (2008-2013)	1,03	0,96


Anni 2005-2017. Trend dei dati di incidenza. COLON E RETTO

	MASCHI			FEMMINE		
	Num_M	TSD_M	ES_TSD_M	Num_F	TSD_F	ES_TSD_F
2005	236	92,92	6,19	162	51,68	4,13
2006	272	106,31	6,56	198	63,19	4,56
2007	216	81,51	5,61	142	45,50	3,87
2008	202	76,80	5,48	154	46,78	3,82
2009	262	97,98	6,12	193	58,90	4,30
2010	217	80,47	5,52	167	48,70	3,84
2011	238	86,03	5,63	179	52,84	4,03
2012	200	72,95	5,20	159	45,26	3,67
2013	274	97,96	5,96	205	60,19	4,29
2014	280	99,23	5,96	221	63,19	4,34
2015	260	90,12	5,64	182	49,67	3,78
2016	234	79,04	5,21	159	43,22	3,53
2017	220	75,40	5,13	199	54,11	3,95




Anni 2005-2017. Tassi età specifici di incidenza COLON E RETTO

ETA'	MASCHI	FEMMINE
0-04	0,00	0,00
05-09	0,00	0,00
10-14	0,00	0,00
15-19	0,47	1,00
20-24	0,86	0,45
25-29	2,04	0,43
30-34	3,12	2,42
35-39	6,34	5,25
40-44	12,04	12,95
45-49	24,61	21,65
50-54	65,00	49,21
55-59	102,22	74,36
60-64	160,91	107,60
65-69	249,49	138,00
70-74	285,72	152,56
75-79	351,90	203,48
80-84	439,12	243,40
85+	396,66	224,45




Anni 2005-2017. Sopravvivenza. COLON E RETTO

	2005-09	2010-14	stima 2015-17
1a_M	80,86	83,03	82,70
2a_M	73,62	75,74	75,31
3a_M	67,40	72,38	68,71
4a_M	64,49	67,87	62,40
5a_M	61,06	64,35	57,71
1a_F	79,57	80,94	78,34
2a_F	70,17	73,43	73,12
3a_F	64,85	67,54	66,22
4a_F	60,88	64,98	61,79
5a_F	57,88	63,42	58,25



Anno 2017. Prevalenza osservata. COLON E RETTO

Anni	MASCHI		FEMMINE	
	Casi	Tassi	Casi	Tassi
2009	357	127,42	280	96,49
2010	528	188,45	395	136,34
2011	702	250,56	527	181,82
2012	860	306,95	651	224,56
2013	941	335,86	728	250,91
2014	1065	380,12	821	282,96
2015	1150	410,46	899	309,84
2016	1264	451,14	965	332,58
2017	1324	472,56	1025	353,53





Anni 2005-2017. Frequenza delle topografie. COLON E RETTO


MASCHI	N	%		FEMMINE	N	%
Cieco	252	8,10		Cieco	315	13,60
Appendice	13	0,40		Appendice	10	0,40
Colon ascendente	418	13,40		Colon ascendente	337	14,50
Flessura epatica	109	3,50		Flessura epatica	64	2,80
Colon trasverso	134	4,30		Colon trasverso	110	4,70
Flessura splenica	76	2,40		Flessura splenica	42	1,80
Colon discendente	256	8,20		Colon discendente	154	6,60
Sigma	596	19,20		Sigma	452	19,50
Lesione sconfinante	17	0,50		Lesione sconfinante	12	0,50
Colon NAS	78	2,50		Colon NAS	71	3,10

Anni 2005-2017. Frequenza morfologie confermate microscopicamente. COLON E RETTO

MASCHI	N	%		FEMMINE	N	%
Adenocarcinoma NAS	1936	69,92		Adenocarcinoma NAS	1327	66,75
Adenocarcinoma specificato	759	27,41		Adenocarcinoma specificato	589	29,63
Carcinoma NAS	21	0,76		Carcinoma NAS	18	0,91
Altre morfologie	49	1,77		Altre morfologie	52	2,62
Non specificato	4	0,14		Non specificato	2	0,10

Anni 2005-2017. Trend delle morfologie.





MASCHI

- EBSIRML < 0.75
- 0.75 < EBSIRML < 0.90
- 0.90 < EBSIRML < 1.10
- 1.10 < EBSIRML < 1.25
- EBSIRML > 1.25



FEMMINE

- EBSIRML < 0.75
- 0.75 < EBSIRML < 0.90
- 0.90 < EBSIRML < 1.10
- 1.10 < EBSIRML < 1.25
- EBSIRML > 1.25