


LINFOMA NON HODGKIN

Anni 2005-2017. Sintesi dei dati di incidenza. LINFOMA NON HODGKIN

	MASCHI	FEMMINE
Numero casi	812	605
% sul totale	2,9	2,7
Tasso grezzo	21,9	15,7
Tasso standardizzato	22,4	14,2
Rischio cumulativo	1,3	0,8
Età media	63	65,2
Età mediana	67	69
Oss/Att AIRTUM (2008-2013)	0,91	0,82
Oss/Att Centro (2008-2013)	0,9	0,88
Oss/Att Nord (2008-2013)	0,84	0,74
Oss/Att Sud (2008-2013)	1,07	1,01


Anni 2005-2017. Trend dei dati di incidenza. LINFOMA NON HODGKIN

	MASCHI			FEMMINE		
	Num_M	TSD_M	ES_TSD_M	Num_F	TSD_F	ES_TSD_F
2005	69	25,22	3,07	44	13,96	2,13
2006	79	28,85	3,29	39	12,71	2,07
2007	53	19,34	2,68	39	12,36	2,01
2008	59	21,73	2,85	30	9,06	1,67
2009	70	25,87	3,13	38	11,02	1,81
2010	62	22,31	2,85	56	17,57	2,38
2011	54	19,47	2,67	47	14,34	2,14
2012	65	22,83	2,85	59	18,78	2,48
2013	63	23,02	2,92	43	13,15	2,04
2014	64	21,80	2,74	54	16,28	2,26
2015	58	20,24	2,67	52	15,26	2,17
2016	60	20,87	2,72	50	14,70	2,12
2017	56	18,97	2,56	54	16,59	2,30




Anni 2005-2017. Tassi età specifici di incidenza LINFOMA NON HODGKIN

ETA'	MASCHI	FEMMINE
0-04	1,26	0,00
05-09	2,28	0,00
10-14	3,12	1,12
15-19	3,28	1,00
20-24	3,86	4,07
25-29	6,52	3,83
30-34	8,98	8,46
35-39	8,57	4,50
40-44	12,04	8,05
45-49	13,56	9,43
50-54	23,57	17,39
55-59	27,73	15,68
60-64	34,69	28,05
65-69	51,95	30,07
70-74	66,53	36,37
75-79	78,50	53,46
80-84	76,82	49,59
85+	57,65	30,88




Anni 2005-2017. Sopravvivenza. LINFOMA NON HODGKIN

	2005-09	2010-14	stima 2015-17
1a_M	83,74	74,63	72,15
2a_M	79,48	69,76	65,73
3a_M	75,28	68,81	59,11
4a_M	72,88	65,71	54,19
5a_M	71,35	62,70	48,69
1a_F	75,29	78,05	82,82
2a_F	69,86	72,82	79,07
3a_F	65,28	69,41	75,22
4a_F	60,47	65,21	71,80
5a_F	58,80	65,02	67,20



Anno 2017. Prevalenza osservata. LINFOMA NON HODGKIN

Anni	MASCHI		FEMMINE	
	Casi	Tassi	Casi	Tassi
2009	84	29,98	88	30,33
2010	125	44,61	126	43,68
2011	163	58,18	158	54,70
2012	195	69,60	184	63,52
2013	234	83,52	213	73,52
2014	263	93,87	241	83,17
2015	297	106,00	275	94,88
2016	332	118,50	292	100,74
2017	356	127,06	303	104,53



Anni 2005-2017. Frequenza delle topografie. LINFOMA NON HODGKIN

MASCHI	N	%		FEMMINE	N	%
Linfonodo	409	50,40		Linfonodo	327	54,00
Milza	26	3,20		Milza	16	2,60
Altri sistema emolinfopoietico	52	6,40		Altri sistema emolinfopoietico	31	5,10
Testa e collo	39	4,80		Testa e collo	24	4,00
Cute	53	6,50		Cute	34	5,60
Stomaco	87	10,70		Stomaco	55	9,10
Altre sedi extranodali	115	14,20		Altre sedi extranodali	93	15,40
Non noto	31	3,80		Non noto	25	4,10

Anni 2005-2017. Frequenza morfologie confermate microscopicamente. LINFOMA NON HODGKIN

MASCHI	N	%		FEMMINE	N	%
Cellule B, Indolenti follicolari	82	11,52		Cellule B, Indolenti follicolari	82	16,05
Cellule B, Indolenti non follicolari	161	22,61		Cellule B, Indolenti non follicolari	117	22,90
Cellule B, Aggressivi	348	48,88		Cellule B, Aggressivi	242	47,36
Cellule T, Indolenti	10	1,40		Cellule T, Indolenti	6	1,17
Cellule T, Aggressivi	45	6,32		Cellule T, Aggressivi	27	5,28
Linfomi dei precursori	15	2,11		Linfomi dei precursori	6	1,17
Non specificato	51	7,16		Non specificato	31	6,07

Anni 2005-2017. Trend delle morfologie.

