


## MAMMELLA

Anni 2005-2017. Sintesi dei dati di incidenza. MAMMELLA

	MASCHI	FEMMINE
<b>Numero casi</b>	55	4476
<b>% sul totale</b>	0,2	20,1
<b>Tasso grezzo</b>	1,5	116,3
<b>Tasso standardizzato</b>	1,5	109,4
<b>Rischio cumulativo</b>	0,1	7,1
<b>Età media</b>	67,1	60,5
<b>Età mediana</b>	66	59
<b>Oss/Att AIRTUM (2008-2013)</b>	0,89	0,73
<b>Oss/Att Centro (2008-2013)</b>	1,01	0,76
<b>Oss/Att Nord (2008-2013)</b>	0,81	0,67
<b>Oss/Att Sud (2008-2013)</b>	1,04	0,87


Anni 2005-2017. Trend dei dati di incidenza. MAMMELLA

	MASCHI			FEMMINE		
	Num_M	TSD_M	ES_TSD_M	Num_F	TSD_F	ES_TSD_F
<b>2005</b>	1	0,38	0,38	286	97,48	5,82
<b>2006</b>	5	2,18	0,98	307	102,32	5,90
<b>2007</b>	6	2,15	0,88	271	88,62	5,44
<b>2008</b>	5	1,73	0,77	285	92,20	5,51
<b>2009</b>	0	0,00	0,00	356	114,32	6,12
<b>2010</b>	4	1,73	0,87	347	111,10	6,03
<b>2011</b>	2	0,61	0,43	357	113,11	6,06
<b>2012</b>	3	1,14	0,67	342	107,96	5,91
<b>2013</b>	8	2,68	0,96	307	95,46	5,51
<b>2014</b>	6	2,10	0,86	405	125,74	6,31
<b>2015</b>	5	1,68	0,75	398	123,32	6,24
<b>2016</b>	8	2,57	0,91	411	126,18	6,32
<b>2017</b>	2	0,66	0,46	404	121,50	6,15




Anni 2005-2017. Tassi età specifici di incidenza MAMMELLA

ETA'	MASCHI	FEMMINE
0-04	0,00	0,00
05-09	0,00	0,00
10-14	0,00	0,00
15-19	0,00	0,00
20-24	0,00	1,36
25-29	0,00	6,39
30-34	0,39	31,03
35-39	0,00	62,62
40-44	0,71	135,75
45-49	1,07	182,31
50-54	1,14	215,72
55-59	2,48	199,77
60-64	4,82	222,56
65-69	4,33	214,89
70-74	1,19	192,47
75-79	5,32	202,96
80-84	6,64	188,58
85+	6,86	183,02




Anni 2005-2017. Sopravvivenza. MAMMELLA

	2005-09	2010-14	stima 2015-17
1a_M	96,45	91,81	96,07
2a_M	99,22	91,42	83,97
3a_M	89,51	86,39	70,48
4a_M	92,52	85,39	63,43
5a_M	89,10	82,29	56,38
1a_F	97,05	97,22	96,60
2a_F	94,60	94,63	94,94
3a_F	91,72	91,88	92,39
4a_F	88,92	90,44	90,11
5a_F	87,10	87,78	87,52



Anno 2017. Prevalenza osservata. MAMMELLA

Anni	MASCHI		FEMMINE	
	Casi	Tassi	Casi	Tassi
2009	9	3,21	772	266,03
2010	14	5,00	1134	390,78
2011	19	6,78	1489	513,11
2012	23	8,21	1741	599,95
2013	26	9,28	2003	690,24
2014	28	9,99	2277	784,66
2015	29	10,35	2541	875,64
2016	29	10,35	2779	957,88
2017	30	10,71	2987	1029,56





Anni 2005-2017. Frequenza delle topografie. MAMMELLA


MASCHI	N	%		FEMMINE	N	%
Capezzolo	3	5,50		Capezzolo	47	1,10
Parte centrale della mammella	24	43,60		Parte centrale della mammella	460	10,30
Quadrante supero-interno	2	3,60		Quadrante supero-interno	516	11,50
Quadrante infero-interno	2	3,60		Quadrante infero-interno	259	5,80
Quadrante supero-esterno	1	1,80		Quadrante supero-esterno	1640	36,60
Quadrante infero-esterno	0	0,00		Quadrante infero-esterno	270	6,00
Prolungamento ascellare	0	0,00		Prolungamento ascellare	23	0,50
Lesione sconfinante della mammella	6	10,90		Lesione sconfinante della mammella	733	16,40
Non specificato	17	30,90		Non specificato	528	11,80

Anni 2005-2017. Frequenza morfologie confermate microscopicamente. MAMMELLA


MASCHI	N	%		FEMMINE	N	%
Duttale	43	89,58		Duttale	2982	75,02
Lobulare	2	4,17		Lobulare	421	10,59
Mucinoso	0	0,00		Mucinoso	89	2,24
Tubulare	0	0,00		Tubulare	28	0,70
Papillare	0	0,00		Papillare	33	0,83
Altre morfologie	2	4,17		Altre morfologie	282	7,09
Carcinoma NAS	0	0,00		Carcinoma NAS	88	2,21
Non specificato	1	2,08		Non specificato	52	1,31

Anni 2005-2017. Trend delle morfologie.





MASCHI



FEMMINE

