


POLMONE

Anni 2005-2017. Sintesi dei dati di incidenza. POLMONE

	MASCHI	FEMMINE
Numero casi	2895	601
% sul totale	10,2	2,7
Tasso grezzo	78,2	15,6
Tasso standardizzato	81,4	13,9
Rischio cumulativo	4,1	0,8
Età media	71,6	69,4
Età mediana	73	71
Oss/Att AIRTUM (2008-2013)	0,75	0,47
Oss/Att Centro (2008-2013)	0,78	0,45
Oss/Att Nord (2008-2013)	0,72	0,4
Oss/Att Sud (2008-2013)	0,79	0,7


Anni 2005-2017. Trend dei dati di incidenza. POLMONE

	MASCHI			FEMMINE		
	Num_M	TSD_M	ES_TSD_M	Num_F	TSD_F	ES_TSD_F
2005	207	80,30	5,67	28	9,34	1,79
2006	220	85,73	5,89	35	10,89	1,86
2007	216	83,56	5,78	43	13,83	2,14
2008	261	98,95	6,19	34	10,46	1,82
2009	247	90,80	5,82	40	11,82	1,90
2010	240	89,70	5,85	51	15,25	2,17
2011	221	80,07	5,44	41	12,47	1,99
2012	217	78,18	5,35	51	15,07	2,15
2013	224	80,74	5,43	66	19,09	2,40
2014	202	71,38	5,05	54	15,30	2,13
2015	220	76,90	5,23	48	13,43	1,98
2016	194	67,23	4,88	53	15,47	2,17
2017	226	77,10	5,18	57	16,93	2,28




Anni 2005-2017. Tassi età specifici di incidenza POLMONE

ETA'	MASCHI	FEMMINE
0-04	0,00	0,00
05-09	0,00	0,00
10-14	0,00	0,56
15-19	0,47	0,50
20-24	0,00	0,00
25-29	0,00	0,43
30-34	1,56	0,81
35-39	2,98	2,62
40-44	6,02	3,15
45-49	10,70	5,59
50-54	39,15	15,91
55-59	79,87	24,92
60-64	161,39	32,65
65-69	239,75	35,98
70-74	297,01	35,36
75-79	383,84	46,72
80-84	413,51	60,03
85+	340,38	47,45




Anni 2005-2017. Sopravvivenza. POLMONE

	2005-09	2010-14	stima 2015-17
1a_M	36,50	42,64	37,68
2a_M	21,01	25,56	24,22
3a_M	16,38	19,32	18,39
4a_M	13,52	15,62	15,86
5a_M	11,79	13,92	12,69
1a_F	47,19	48,41	53,26
2a_F	29,58	32,31	37,51
3a_F	24,02	27,33	29,52
4a_F	20,79	23,68	22,96
5a_F	19,35	21,03	18,46



Anno 2017. Prevalenza osservata. POLMONE

Anni	MASCHI		FEMMINE	
	Casi	Tassi	Casi	Tassi
2009	178	63,53	64	22,05
2010	211	75,42	79	27,22
2011	237	84,70	95	32,74
2012	268	95,76	107	36,87
2013	291	103,97	114	39,28
2014	317	113,25	117	40,32
2015	331	118,25	131	45,14
2016	348	124,32	135	46,52
2017	363	129,67	138	47,59





Anni 2005-2017. Frequenza delle topografie. POLMONE


MASCHI	N	%		FEMMINE	N	%
Trachea	3	0,10		Trachea	1	0,20
Bronco principale	356	12,30		Bronco principale	80	13,30
Lobo superiore	1055	36,40		Lobo superiore	210	34,90
Lobo medio	132	4,60		Lobo medio	30	5,00
Lobo inferiore	551	19,00		Lobo inferiore	123	20,50
Lesione sconfinante del polmone	162	5,60		Lesione sconfinante del polmone	34	5,70
Non specificato	636	22,00		Non specificato	123	20,50

Anni 2005-2017. Frequenza morfologie confermate microscopicamente. POLMONE


MASCHI	N	%		FEMMINE	N	%
Squamocellulare	626	34,41		Squamocellulare	57	15,57
Adenocarcinoma	596	32,77		Adenocarcinoma	211	57,65
Grandi cellule	47	2,58		Grandi cellule	8	2,19
Non a piccole cellule	113	6,21		Non a piccole cellule	13	3,55
Piccole cellule	279	15,34		Piccole cellule	33	9,02
Carcinoma NAS	50	2,75		Carcinoma NAS	11	3,01
Altre morfologie	47	2,58		Altre morfologie	24	6,56
Non specificato	61	3,35		Non specificato	9	2,46

Anni 2005-2017. Trend delle morfologie.





MASCHI



FEMMINE

