


PROSTATA

Anni 2005-2017. Sintesi dei dati di incidenza. PROSTATA

| | MASCHI |
|-----------------------------------|--------|
| Numero casi | 4030 |
| % sul totale | 14,3 |
| Tasso grezzo | 108,9 |
| Tasso standardizzato | 113,8 |
| Rischio cumulativo | 6 |
| Età media | 72,2 |
| Età mediana | 73 |
| Oss/Att AIRTUM (2008-2013) | 0,83 |
| Oss/Att Centro (2008-2013) | 0,82 |
| Oss/Att Nord (2008-2013) | 0,75 |
| Oss/Att Sud (2008-2013) | 1,05 |


Anni 2005-2017. Trend dei dati di incidenza. PROSTATA

| | MASCHI | | |
|-------------|--------|--------|----------|
| | Num_M | TSD_M | ES_TSD_M |
| 2005 | 269 | 105,34 | 6,56 |
| 2006 | 311 | 121,48 | 7,04 |
| 2007 | 317 | 121,88 | 6,94 |
| 2008 | 362 | 137,63 | 7,32 |
| 2009 | 336 | 126,10 | 6,94 |
| 2010 | 351 | 131,85 | 7,10 |
| 2011 | 337 | 124,33 | 6,85 |
| 2012 | 316 | 117,16 | 6,64 |
| 2013 | 301 | 110,34 | 6,40 |
| 2014 | 295 | 105,01 | 6,15 |
| 2015 | 299 | 106,68 | 6,23 |
| 2016 | 272 | 95,01 | 5,83 |
| 2017 | 264 | 90,29 | 5,60 |




Anni 2005-2017. Tassi età specifici di incidenza PROSTATA

| ETA' | MASCHI |
|-------|--------|
| 0-04 | 0,00 |
| 05-09 | 0,00 |
| 10-14 | 0,00 |
| 15-19 | 0,00 |
| 20-24 | 0,86 |
| 25-29 | 0,00 |
| 30-34 | 0,00 |
| 35-39 | 0,00 |
| 40-44 | 0,35 |
| 45-49 | 6,78 |
| 50-54 | 36,49 |
| 55-59 | 92,28 |
| 60-64 | 210,05 |
| 65-69 | 393,99 |
| 70-74 | 491,85 |
| 75-79 | 560,12 |
| 80-84 | 526,38 |
| 85+ | 411,75 |



Anni 2005-2017. Sopravvivenza. PROSTATA

| | 2005-09 | 2010-14 | stima 2015-17 |
|------|---------|---------|---------------|
| 1a_M | 96,10 | 96,68 | 94,96 |
| 2a_M | 93,83 | 94,32 | 91,16 |
| 3a_M | 91,38 | 92,32 | 87,73 |
| 4a_M | 89,71 | 92,33 | 83,23 |
| 5a_M | 89,35 | 91,33 | 79,11 |



Anno 2017. Prevalenza osservata. PROSTATA

| Anni | MASCHI | |
|------|--------|--------|
| | Casi | Tassi |
| 2009 | 486 | 173,46 |
| 2010 | 738 | 263,41 |
| 2011 | 966 | 344,78 |
| 2012 | 1196 | 426,87 |
| 2013 | 1420 | 506,82 |
| 2014 | 1642 | 586,06 |
| 2015 | 1879 | 670,89 |
| 2016 | 2071 | 739,42 |
| 2017 | 2246 | 801,88 |



Anni 2005-2017. Frequenza morfologie confermate microscopicamente. PROSTATA

| MASCHI | N | % |
|--|----------|----------|
| Carcinoma ben differenziato | 282 | 8,13 |
| Carcinomi moderatamente differenziati | 1835 | 52,90 |
| Carcinomi scarsamente differenziati | 1230 | 35,46 |
| Carcinomi NAS | 119 | 3,43 |
| Altre morfologie | 1 | 0,03 |
| Non specificato | 2 | 0,06 |

Anni 2005-2017. Trend delle morfologie.

