


## STOMACO

Anni 2005-2017. Sintesi dei dati di incidenza. STOMACO

	MASCHI	FEMMINE
<b>Numero casi</b>	1087	764
<b>% sul totale</b>	3,8	3,4
<b>Tasso grezzo</b>	29,4	19,8
<b>Tasso standardizzato</b>	30,5	16,8
<b>Rischio cumulativo</b>	1,5	0,8
<b>Età media</b>	71,1	73,2
<b>Età mediana</b>	73	76
<b>Oss/Att AIRTUM (2008-2013)</b>	0,93	1,01
<b>Oss/Att Centro (2008-2013)</b>	0,78	0,8
<b>Oss/Att Nord (2008-2013)</b>	0,85	0,94
<b>Oss/Att Sud (2008-2013)</b>	1,23	1,32


Anni 2005-2017. Trend dei dati di incidenza. STOMACO

	MASCHI			FEMMINE		
	Num_M	TSD_M	ES_TSD_M	Num_F	TSD_F	ES_TSD_F
2005	92	36,04	3,85	51	16,20	2,31
2006	74	28,65	3,39	52	16,00	2,26
2007	80	30,45	3,45	67	19,70	2,44
2008	76	28,55	3,32	58	17,33	2,30
2009	85	32,04	3,52	53	15,82	2,20
2010	99	36,64	3,72	62	17,82	2,30
2011	79	28,21	3,21	60	16,86	2,22
2012	87	31,90	3,44	68	19,53	2,43
2013	83	29,66	3,28	54	14,74	2,06
2014	105	36,59	3,59	59	16,29	2,17
2015	80	27,76	3,13	68	17,79	2,22
2016	72	24,17	2,87	56	15,14	2,07
2017	75	25,22	2,93	56	14,93	2,08




Anni 2005-2017. Tassi età specifici di incidenza STOMACO

ETA'	MASCHI	FEMMINE
0-04	0,00	0,00
05-09	0,00	0,00
10-14	0,00	0,00
15-19	0,47	0,00
20-24	0,43	0,00
25-29	0,81	0,43
30-34	0,39	0,00
35-39	3,73	3,00
40-44	6,37	6,65
45-49	10,34	6,99
50-54	19,01	9,62
55-59	35,59	18,49
60-64	43,36	28,51
65-69	73,60	31,54
70-74	99,20	49,00
75-79	139,70	72,67
80-84	157,44	93,31
85+	164,70	103,94




Anni 2005-2017. Sopravvivenza. STOMACO

	2005-09	2010-14	stima 2015-17
1a_M	51,20	53,25	53,58
2a_M	36,59	39,66	40,49
3a_M	30,81	34,76	33,04
4a_M	28,75	31,25	28,98
5a_M	27,73	30,21	27,35
1a_F	51,00	47,14	46,14
2a_F	38,62	39,39	35,03
3a_F	31,60	34,56	28,01
4a_F	29,09	31,26	27,33
5a_F	26,04	28,80	23,78



Anno 2017. Prevalenza osservata. STOMACO

Anni	MASCHI		FEMMINE	
	Casi	Tassi	Casi	Tassi
2009	78	27,84	54	18,61
2010	111	39,62	73	25,16
2011	139	49,61	91	31,36
2012	160	57,11	111	38,25
2013	180	64,33	125	43,08
2014	200	71,47	135	46,52
2015	216	77,18	149	51,35
2016	227	81,10	161	55,48
2017	239	85,39	167	57,55





Anni 2005-2017. Frequenza delle topografie. STOMACO


MASCHI	N	%		FEMMINE	N	%
Cardias	143	13,20		Cardias	47	6,20
Fondo	48	4,40		Fondo	29	3,80
Corpo	185	17,00		Corpo	106	13,90
Antro gastrico	253	23,30		Antro gastrico	248	32,50
Piloro	23	2,10		Piloro	22	2,90
Piccola curva	115	10,60		Piccola curva	66	8,60
Grande curva	24	2,20		Grande curva	14	1,80
Lesione sconfinante	104	9,60		Lesione sconfinante	84	11,00
Non specificato	192	17,70		Non specificato	148	19,40

Anni 2005-2017. Frequenza morfologie confermate microscopicamente. STOMACO


MASCHI	N	%		FEMMINE	N	%
Carcinoma ad anello con castone	266	28,09		Carcinoma ad anello con castone	188	29,75
Adenocarcinoma, tipo intestinale	119	12,57		Adenocarcinoma, tipo intestinale	56	8,86
Adenocarcinoma NAS	280	29,57		Adenocarcinoma NAS	172	27,22
Altri adenocarcinomi specificati	187	19,75		Altri adenocarcinomi specificati	119	18,83
Altre morfologie	39	4,12		Altre morfologie	19	3,01
Carcinoma NAS	52	5,49		Carcinoma NAS	67	10,60
Non specificato	4	0,42		Non specificato	11	1,74

Anni 2005-2017. Trend delle morfologie.





MASCHI



FEMMINE

